



Rec. 24/1 : Desarrollo del lenguaje y detección precoz de los trastornos del lenguaje.

En el niño de 0 a 3 años, todo déficit auditivo, visual neuromotor, todo problema relacionado puede llevar a una alteración o retraso en el desarrollo del lenguaje.

Una tabla simple, que recoge las etapas esenciales del desarrollo auditivo, visual, neuromotor y del lenguaje del niño de 0 a 3 años, da las referencias indispensables para un diagnóstico e intervención precoz.

El BIAP recomienda la sensibilización de los padres y de las personas relacionadas con la infancia para así poder detectar lo antes posible las alteraciones del desarrollo que podrían conllevar alteraciones del lenguaje.

Una amplia difusión de este documento debería contribuir a ello.

Pertisau (A) 01.05.1989

<p>HACIA EL LENGUAJE</p> <p>Etapas del desarrollo</p> <p>El niño hablará</p> <p>- si su entorno comunica con él</p> <p>- si ve los gestos</p> <p>- si oye las palabras del que le habla</p> <p>- si puede realizar los movimientos que producen el habla</p>	<p style="text-align: center;">Recomendación BIAP 1991</p> <p style="text-align: center;">Adaptada por el C. E. A. F.</p>	<p>Dificultades auditivas, visuales, motrices, dificultades de comunicación, pueden impedir o retrasar el desarrollo del habla y del lenguaje.</p> <p>Con un seguimiento precoz, el niño tiene la oportunidad de evolucionar favorablemente.</p> <p>Existen consultas especializadas en el diagnóstico de los trastornos auditivos, visuales, motores, relacionales y trastornos del lenguaje en el niño muy joven.</p> <p>Su médico se lo indicará</p>
---	--	--

[< Anterior](#)